

健康のひろば

—32—

地元の医師がアドバイス

勧めします。

また、「めまい」

を伴うかどうかでも、状況は変わります。

めまいがある場合、

は、蝸牛・三半規管・前庭等、内耳全

体が障害されている

ことを意味します。

めまいがない場合は、

蝸牛だけが障害

されています。

お尋ねのケースに

ついて考えてみま

す。

とですので、突発性難聴、急性感音性難聴の可能性があり、一刻も早く治療を開始する必要がありま

るので、治療を急ぐ必要はありません。

いずれにせよ、原因を明確にするため

にも、早めに耳鼻科

を受診し、聴力検査を受けてください。

があつた場合は、

「メニエール病」という病気の可能性が

考えられ、このケー

スも早めに治療を開

始すべきです。

また聴力検査をす

ると正常だった、と

いうこともあります。これは心因性の

(医療法人臨生会・吉田病院院長・吉田
肇)



突然、耳がつまつた感じ、耳鳴り（キーン、ゴー、ピー）の難聴を訴える娘（二十一歳）のことですが、病院嫌いで、ここ二週間様子をみていましたが、症状は続いています。

突然に難聴の症状に見舞われる」とがあるのですか。

（名寄市・主婦）

「成人の女性が突然耳がつまつた感じ、耳鳴りと耳鳴りがする」という、漠然とした訴えですので、この情報だけで、結論を出すのはなかなか難しいと思います。

難聴がない場合、病態としては、深刻なケースは少なく、治療を急ぐ必要はないことが多いのです。耳鳴り、ともに種々の疾患で起こります。さらに突然の難聴も訴えています。

耳鳴りについて耳鳴りと難聴が突然起こったということがあるのです。

は、まったく音のしない無響室に入つた